- Busque señales de mareo - si su perro actúa de forma diferente en el coche, saliva o babea mucho o generalmente no parece contento, entonces puede sentirse mareado.
- Pida consejo a su veterinario - si su perro muestra señales de mareo, o quiere usted hacer un viaje muy largo, pida a su veterinario algún producto que pueda impedir los vómitos causados por el mareo.
- No deje que el mareo de su perro restrinja sus planes - existen productos especiales que pueden impedir el problema en la mayoría de los perros.
- Haga que los viajes sean lo menos estresantes que sea posible - no dé de comer a su perro justo antes de salir de viaje, deje que entre bastante aire en el coche, haga paradas con regularidad y dele agua limpia abundante.
- Empiece pronto - inicie los viajes en coche gradualmente desde el principio, de manera que el perro los asocie con buenas experiencias (como paseos) y no con estrés.

1 Data on file. Pfizer EU study (NL, IT, SP): Use of Cerenia in dogs with motion sickness. 2008 2 Acepromazine Summary of Product Characteristics 3 Benchaoui HA et al. Vet Rec 2007; 161: 444-447; 4 Conder GA et al. J Vet Pharmacol, Ther 2008; 31: 528–532 5 Pfizer data on file SP study 2008

CEPR09

Pfizer Salud Animal

Si tu perro se marea en los viajes tienes tres opciones:

¿Cuál de ella prefieres?

Sufrir las consecuencias

Darle un sedante que le deje "tirado" durante horas

Un tratamiento que le permita viajar feliz

Pfizer Salud Animal

El 90 % de los propietarios de perros aseguran que disfrutan más al viajar con sus perros después de probar el nuevo tratamiento no sedante de Pfizer.[1]

Por fin feliz de viajar

La mejor elección para tu perro

Compara las reacciones adversas para tu perro de este nuevo tratamiento

	Nuevo tratamiento de Pfizer	Tratamiento Sedante[2]
¿Somnolencia?	NO	SÍ
¿Baja presión arterial y aumento del ritmo cardiaco?	NO	SÍ
¿Respiración ralentizada?	NO	SÍ
¿Descenso de la temperatura corporal?	NO	SÍ

El 66% de los usuarios de sedativos encuestados manifiestan no estar totalmente satisfechos.[5]

Con el nuevo tratamiento de Pfizer:

- Tu perro estará tan normal como siempre, durante y después del viaje.
- Bastará con una sola dosis, administrada de 1 a 10 horas antes del viaje, para prevenir los vómitos provocados por el mareo.
- El 89 % de los propietarios que con perros que padecen mareo, después de haber sido utilizado el nuevo tratamiento una vez, aseguran que lo utilizarán habitualmente.[1]

Se debe dar una comida ligera o un tentempié antes de la dosis.

CONSULTE AHORA EN SU CENTRO VETERINARIO